



La psicopatología general en niños y adolescentes

► La psicopatología general (PG) en niños y adolescentes comprende todas las manifestaciones de una enfermedad psiquiátrica, así como los problemas de salud mental y del neurodesarrollo que los niños y los adolescentes muestran.

Los trastornos del neurodesarrollo (TND) incluyen diagnósticos como la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los trastornos internalizados (TI) se integran a la depresión, y a todos los trastornos de ansiedad relacionados con el estrés y al espectro obsesivo compulsivo. Los trastornos externalizados (TE) incluyen al trastorno oposicionista y desafiante, al trastorno de conducta, y a otros trastornos del control de los impulsos, como el trastorno explosivo intermitente e incluso los trastornos por uso de alcohol y drogas. Cada una de estas dimensiones de trastornos, los TND, TI y TE, comparten manifestaciones y síntomas comunes que generan las “comunalidades” que las agrupan (Blanco et al., 2015).

Estas manifestaciones clínicas compartidas por diferentes trastornos o “comunalidades” constituyen lo que ahora se conoce como el “Factor P”. Este factor es una representación global de la psicopatología y se asocia con mayor deterioro en la vida, mayor carga familiar de la enfermedad, peores historias del desarrollo y mayor compromiso de la función cerebral a edades tempranas. Este “Factor P” explica por qué es difícil encontrar

causas, consecuencias, biomarcadores y tratamientos con especificidad para los trastornos mentales individuales (Caspi et al., 2014). En la población adulta son tres los “subfactores” que lo integran: el factor de las alteraciones del pensamiento o del dominio de las experiencias psicóticas, el factor internalizado y el factor externalizado (Caspi & Moffitt, 2018). En la población pediátrica, especialmente en la preescolar, los TND constituyen uno de estos factores.

Las altas tasas de comorbilidad entre los trastornos psiquiátricos sugieren que puede haber una estructura más parsimoniosa para la psicopatología, que la implicada por las clasificaciones actuales (DSM & CIE) con categorías discretas; las dimensiones de los diferentes grupos diagnósticos deben ser una realidad al evaluar y atender a los niños y adolescentes que los padecen. De esta forma este número del Boletín de Información Clínica integra los trabajos de las “comunalidades” para los TND, los TI y los TE, su diagnóstico y tratamiento.

Francisco R. de la Peña Olvera

Referencias

- Blanco, C., Wall, M. M., He, J. P., Krueger, R. F., Olfson, M., Jin, C. J., ... Merikangas, K. R. (2015). The space of common psychiatric disorders in adolescents: comorbidity structure and individual latent liabilities. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 54(1), 45-52. doi: 10.1016/j.jaac.2014.10.007
- Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., ... Moffitt, T. E. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? *Clinical Psychological Science*, 2(2), 119-137. doi: 10.1177/2167702613497473
- Caspi, A., & Moffitt, T. E. (2018). All for one and one for all: Mental disorders in one dimension. *American Journal of Psychiatry*, 175(9), 831-844. doi: 10.1176/appi.ajp.2018.17121383

TraDeA[®] LP


Metilfenidato

Su aliado en el control de los síntomas del

TDAH

FÓRMULA MEJORADA que ofrece mayor:¹

- EFICACIA ✓
- TOLERABILIDAD ✓
- CUMPLIMIENTO ✓



Eficacia de hasta
12 HORAS^{2,3}



27 mg



20 mg



36 mg



54 mg



Referencias:

1.-Sandoval P y cols. Mecanismos generales de cesión de principios activos a partir de matrices monolíticas hidrofílicas preparadas con éteres de celulosa. Rev Colomb Cienc Quim Farm 2008;37(2):105-121. 2.-Información Para Prescribir Tradea LP. 3.-Tomado de: Estudio clínico abierto, 1 período, 1 tratamiento, 1 secuencia, dosis única para evaluar la farmacocinética del Clorhidrato de Metilfenidato, tabletas de liberación prolongada de 54 mg en condiciones de ayuno. 2013. Centro de Investigación Clínica y del Centro Analítico para Estudios Biotfarmacéuticos de Investigación, Ciencia y Tecnología Internacional, S.A. de C.V., y de Psicofarma, S.A. de C.V.

MASENNUS



Atomoxetina

El cambio efectivo de la historia en el paciente con TDAH

